

Аффективные синдромы

- Депрессивный
- Маниакальный
- Маниакальный синдром – триада основных симптомов: повышенное настроение; двигательное возбуждение; идеаторно-психическим возбуждением.
- Простые(типичные) – Веселая мания (выражен больше аффективный компонент) ; Возбужденная мания (двигательный)
- Мания «со скачкой идей» (идеаторный)

Аффективный синдром

- Смешанные аффективный синдромы - когда один из компонентов отсутствует или имеет отрицательный знак
- Гневливая мания (аффективная отр)
- Заторможенная мания (двигательный отр)
- Непродуктивная мания (идеаторный отр)

Аффективный синдром

- Сложные (атипичные) – Появление в структуре аффективного синдрома других психопатологических проявлений (обсессивных, сенесто-ипохондрических, галлюцинаторно-бредовых)

Аффективный синдром

- Депрессивный синдром триада облигатных симптомов: Пониженное настроение; замедленное течение представлений; речедвигательная заторможенность.
- Простые депрессии: тоскливая депрессия преобладает аффективный компонент; адинамическая депрессия преобладает двигательная заторможенность; апатическая депрессия преобладает идеаторная заторможенность.

Аффективные синдромы

- Смешанные депрессии : Улыбающаяся (ироническая)депрессия инверсия аффективного компонента ; Ажитированная депрессия инверсия двигательного компонента; депрессия « со скачкой идей» инверсия идеаторного компонента
- Сложные (атипичные) депрессии: Депрессивно –параноидный синдром. Особенностью является вторжение в аффективный синдром, соответствующий маниакально-депрессивному психозу, симптоматики из других нозологических форм –шизофрении, экзогенных и органических психозов.

Аффективные синдромы

- Меланхолический вариант (тоскливая депрессия); Тревожная депрессия (ажитированная); Ипохондрическая депрессия – выраженные ипохондрические идеи вплоть до синдрома Котара. ; Анестетическая депрессия бесчувствие; Апатическая депрессия ослабление побуждений и желаний; Маскированная депрессия- различные вегетативные и соматические симптомы.