






Конн ауруы дегеніміз не?

- Гипокалемиямен ұштасатын төмен ренинді артериялық гипертензиямен сипатталатын , альдестеронның шектен тыс бөлінуі нәтижесінде дамидын клиникалық синдром.




Классификациясы

1. Альдестеронөндіруші аденома
2. Идиопатиялық гиперальдостеронизм
3. Глюкокортикоидтежеуші гиперальдостеронизм



Басты клиникалық белгілері қандай?

АҚ – жоғарылауы бастың, қатты ауруы,
көрудің нашарлауы, парестезиялар,
бұлшықет әлсіздігі, қатты шөлдеу сезімі,
түнгі диурез жоғарылауы



Амбулаториялық жағдайда қандай негізгі диагностикалық шаралар жүргізіледі?

- ▣ - қан сарысуында калийді анықтау,
- қан плазмасында альдостерон деңгейін анықтау,
- бүйрекүсті безіне УЗИ,
- бүйрекүсті безіне сцинтиграфия,
- бүйрекүсті безіне КТ



Стационарда қандай негізгі диагностикалық шаралар жүргізіледі?

- Натриймен пероральды жүктеме сынамасын жүргізу.
 - Натрий хлоридінің изотониялық ерітіндісімен венаішілік сынама жүргізу.
 - Флюдрокортизонмен сынама жүргізу.
 - Ортостатикалық сынама жүргізу.



Қандай лабораториялық зерттеулер жүргіземіз?

- ▣ 1-Нәжістің жалпы анализі өзгеріссіз
- ▣ 2-ЗЖА
- ▣ 3-БХА



Қандай хирургиялық ем жүргізіледі?

- Адреналэктомия



Біріншілік гиперальдестеронизм дамуына жиі әкелетін себеп ?

- Альдестеронөндіруші аденома.



Ағзада натрий мен калий қандай деңгейде болады?

- Ағзада натрий мөлшері ұсталып, калий көп шығады

