

# Презентация Преобразование плоскости




ГЕОМЕТРИЯ 9 КЛАСС

# I - группа. Свойства движения



## Теорема 1

При движении точки, лежащие на прямой, переходят в точки, лежащие на прямой, причем порядок взаимного расположения точек на прямой сохраняется.



## Доказательство:


1. Пусть точки  $A, B$  и  $C$  принадлежат прямой  $d$ , причем  $A-B-C \rightarrow AB+BC=AC$
2.  $f(A)=A_1, f(B)=B_1, f(C)=C_1$ , т.к.  $f$ - движение, то  $A_1B_1=AB, B_1C_1=BC, A_1C_1=AC \rightarrow A_1B_1+B_1C_1=AB+BC=AC=A_1C_1 \rightarrow A_1B_1+B_1C_1=A_1C_1 \rightarrow A_1, B_1$  и  $C_1$  принадлежат некоторой прямой  $d_1$  и  $A_1-B_1-C_1$ .

## Следствие 1

При движении прямые переходят в прямые, лучи - в лучи, отрезок заданной длины - в отрезок той же длины.

## Теорема 2


*При движении окружность переходит в окружность того же радиуса.*



1.  $f$ - некоторое движение,  $f(O)=O_1$
2.  $M$ - произвольная точка окружности, следовательно  $f(M)=M_1$ , по определению движения  
 $O_1 M_1=OM=r$ , таким образом при заданном движении окружность с центром  $O$  и радиусом  $r$  перейдет в окружность с центром  $O_1$  и тем же радиусом  $r$ .

## Теорема 3

*При движении треугольник отображается на равный ему треугольник.*



При движении отрезок переходит в отрезок равный данному.  
Следовательно, треугольник переходит в треугольник равный данному (по третьему признаку).

## Следствие 2


*При движении угол переходит в равный ему угол, фигура переходит в равную фигуру.*

# II-группа. Центральная симметрия



## Определение.

Точки  $A$  и  $A_1$  называются симметричными относительно точки  $O$ , если точка  $O$  принадлежит отрезку  $AA_1$  и этой точкой отрезок  $AA_1$  делится пополам.



$$Z_O(A) = A_1$$


$O$  - центр симметрии

$A$  и  $A_1$  - центрально симметричные.

Т.к. точка  $A$  - произвольная точка плоскости, то отображение  $Z_O$  задано на всей плоскости. Это отображение называется симметрией относительно точки  $O$  (центральной симметрией).

## Теорема

*Симметрия относительно точки является движением.*




### Доказательство:

Точки  $A$ ,  $B$  и  $O$  не лежат на одной прямой

1.  $Z_O(A) = A_1$ ,  $Z_O(B) = B_1 \rightarrow AO = A_1O$ ,  $BO = B_1O$ ,  $\angle AOB = \angle A_1OB_1$  - как вертикальные;
2. Следовательно,  $\triangle AOB = \triangle A_1OB_1$  по двум сторонам и углу между ними (I признак);
3. Из равенства треугольников следует, что  $AB = A_1B_1$ .

Точки  $A$ ,  $B$  и  $O$  лежат на одной прямой




$$A_1B_1 = |OB_1 - OA_1| = |OB - OA| = AB \quad \text{или}$$

$$A_1B_1 = A_1O + OB_1 = OA + OB = AB, \quad \text{а следовательно } Z_O - \text{движение.}$$

### Свойства центральной симметрии


1. Центр симметрии точка  $O$ , единственная неподвижная точка, т.е.  $Z_o(O) = O$
2. Прямая, проходящая через центр симметрии переходит в себя.



$$M \in m \rightarrow M_1 \in m$$



3. Прямая, не проходящая через центр симметрии, переходит в параллельную ей прямую (следует из равенства накрест лежащих углов при прямых  $AB$  и  $A_1B_1$ , секущей  $BB_1$ )

$$O \notin AB; Z_o(AB) = A_1B_1, AB \parallel A_1B_1$$



4. Центральная симметрия изменяет направление

$$\overrightarrow{AB} \updownarrow \overrightarrow{A_1B_1}$$



$$Z_o(A) = A_1, \quad Z_o(A_1) = A$$

$$Z_o(A) = C, \quad Z_o(B) = D, \quad Z_o(C) = A, \quad Z_o(D) = B$$

### Определение:

Если некоторая фигура при симметрии относительно точки  $O$  переходит в себя, то точка  $O$  называется центром симметрии этой фигуры, а фигура называется симметричной относительно точки  $O$ .


$$Z_o(\Phi) = \Phi$$

# III-группа. Осевая симметрия.



## Определение.

Точки  $A$  и  $A_1$  называются симметричными относительно прямой  $l$ , если отрезок  $AA_1$  перпендикулярен прямой  $l$  и делится этой прямой пополам.



$$S_l(A) = A_1$$

$A$  и  $A_1$  - симметричные точки.


$l$  - ось симметрии

Т.к. точка  $A$  - произвольная точка плоскости, то отображение  $S_l$  задано на всей плоскости. Это отображение называется симметрией относительно прямой  $l$  (осевой симметрией).

## Теорема


*Симметрия относительно прямой является движением*

$X$  и  $Y$  - произвольные точки плоскости, лежащие в одной полуплоскости относительно прямой  $l$ .




1.  $S_l(X) = X_1$ ,  $S_l(Y) = Y_1$ ,  $XX_1 \cap l = A$ ,  $YY_1 \cap l = B$
2.  $\triangle ABY$  и  $\triangle ABY_1$  - прямоугольные (по определению осевой симметрии)  
 $\triangle ABY = \triangle ABY_1$  - по двум катетам  $\rightarrow AY = AY_1$  и  $\angle YAB = \angle Y_1AB$
3. Рассмотрим  $\triangle XAY$  и  $\triangle X_1AY_1$ :  
 $XA = X_1A$  (по определению осевой симметрии)  
 $AY = AY_1$  (по доказанному)  
 $\angle XAY = \angle X_1AY_1$  (как разность прямых и равных углов)  
 Следовательно,  $\triangle XAY = \triangle X_1AY_1$  (по двум сторонам и углу между ними, I признак)
4. Из равенства треугольников следует равенство отрезков  $XY$  и  $X_1Y_1$ .

$X$  и  $Y$  -произвольные точки плоскости, лежащие в разных полуплоскостях относительно прямой  $l$ .



Равенство отрезков  $XY$  и  $X_1Y_1$  следует из равенства по двум катетам прямоугольных треугольников  $X_1CA$  и  $XCA$ ,  $YCB$  и  $Y_1CB$ .

$X$  и  $Y$  -произвольные точки плоскости, одна из точек лежит на прямой  $l$ .



$S_l(X) = X$ ,  $S_l(Y) = Y_1 \rightarrow \triangle XYB = \triangle XY_1B$  (по двум катетам)  $\rightarrow XY = XY_1$


**Т.о. осевая симметрия - движение**

**Свойства осевой симметрии**

1.  $S_l(l) = l$  - любая точка оси симметрии - неподвижна (переходит сама в себя);
2. Прямая перпендикулярная оси симметрии переходит сама в себя;
3. Соответствующие прямые пересекаются на оси симметрии или параллельны;

### Определение

Если некоторая фигура при симметрии относительно прямой  $m$  переходит в себя, то прямая  $m$  называется осью симметрии этой фигуры, а фигура называется симметричной относительно прямой  $m$ .



$$S_m(\Phi) = \Phi$$




# IV группа. Параллельный перенос.




## Определение.

Параллельным переносом на заданный вектор  $\overrightarrow{AB}$  называется преобразование плоскости, при котором каждая точка плоскости  $M$  переходит в  $M_1$  так, что  $\overrightarrow{MM_1} = \overrightarrow{AB}$  и обозначается  $P_{\overrightarrow{AB}}(M) = M_1$ .



## Теорема

*Параллельный перенос является движением*




1.  $P_{\overrightarrow{AB}}(X) = X_1$ ,  $P_{\overrightarrow{AB}}(Y) = Y_1 \rightarrow XX_1 \parallel AB$ ,  $XX_1 = AB$ ;  $YY_1 \parallel AB$ ,  $YY_1 = AB$
2. Следовательно,  $XX_1 \parallel YY_1$  и  $XX_1 = YY_1$
3.  $YXX_1Y_1$  - параллелограмм по признаку
4. По свойству параллелограмма  $XY = X_1Y_1$ , значит **параллельный перенос - движение.**


## Свойства параллельного переноса

1. Параллельный перенос не имеет неподвижных точек;
2. Прямые, параллельные направлению переноса, переходят в себя;
3. Параллельный перенос сохраняет направление, т.е. если  $A \rightarrow A_1$  и  $B \rightarrow B_1$ , то лучи  $AB$  и  $A_1B_1$  сонаправлены. Обратно: движение, сохраняющее направление является параллельным переносом.
4. Композиция (последовательное выполнение) двух параллельных переносов - параллельный перенос, причем параллельные переносы - перестановочны:  $P_a^- \circ P_b^- = P_b^- \circ P_a^- = P_{a+b}^-$

Следствие: Любую композицию параллельных переносов можно заменить одним параллельным переносом (по правилу многоугольника)



**Орнамент.** Это узор, который получается, если некоторую фигуру подвергнуть параллельному переносу несколько раз.



# V группа. Поворот.




## Определение.

Отметим на плоскости точку  $O$  ( центр поворота) и угол  $\phi$  (угол поворота).

Преобразование плоскости, при котором каждая точка  $M$  плоскости переходит в точку  $M_1$  такую, что угол между лучами  $OM$  и  $OM_1$  равен  $\phi$ , а  $OM=OM_1$ , называется поворотом около точки  $O$  на угол  $\phi$ .

$\phi > 0$  - если поворот совершается против часовой стрелки


$\phi < 0$  - если поворот совершается по часовой стрелки



$$R_O^\phi(M) = M_1, \quad \phi > 0$$

## Теорема.

*Поворот является движением.*




1.  $R_O^\phi(X) = X_1, R_O^\phi(Y) = Y_1 \rightarrow OX=OX_1, OY=OY_1$
2.  $\angle XOY = \phi - \angle X_1OY, \angle X_1OY_1 = \phi - \angle X_1OY \rightarrow \angle XOY = \angle X_1OY_1$
3. Значит,  $\triangle XOY = \triangle X_1OY_1$  - по двум сторонам и углу между ними, тогда  $XY = X_1Y_1$   
Т.к. точки  $X$  и  $Y$  произвольные, следовательно, **поворот- движение**

### Свойства поворота.

1. Поворот вокруг точки  $O$  на  $180^\circ$  является центральной симметрией относительно точки  $O$ .
2. Центр вращения - единственная неподвижная точка,  $R_O^\varphi(O)=O$ .

Окружности с центрами в точке  $O$  (центре поворота) - переходят сами в себя.



3. Если  $R_O^\varphi(A)=A_1$ ,  $R_O^\varphi(B)=B_1$ , то угол между  $AB$  и  $A_1B_1$  равен  $\varphi$ ;
4. Композиция двух вращений с общим центром на углы  $\alpha$  и  $\beta$  соответственно является вращением с тем же центром на угол  $\alpha+\beta$ . При этом вращения перестановочны.

$$R_O^\alpha \circ R_O^\beta = R_O^\beta \circ R_O^\alpha = R_O^{\alpha+\beta}$$


5. Тожественное преобразование можно рассматривать как поворот на нулевой угол.
6. Композиция двух вращений с центрами  $O_1$  и  $O_2$  на углы  $\alpha$  и  $\beta$ , соответственно, является вращением с новым центром  $O$  на угол  $\alpha+\beta$ , если  $\alpha+\beta \neq 360^\circ$ , и параллельным переносом, если  $\alpha+\beta=360^\circ$ .

# VI группа. Подобие.



## Определение.

Преобразование фигуры  $F$  в фигуру  $F_1$  называется преобразованием подобия, если при этом преобразовании расстояния между точками изменяются в одно и тоже число раз.



$P_k(F)=F_1$ ,  $P_k$  - подобие с коэффициентом  $k$

$$f: X \longrightarrow X_1$$

$$f: Y \longrightarrow Y_1, \quad X_1Y_1 = k \cdot XY, \text{ где } k > 0 \text{ - является одним и тем же для всех точек } X \text{ и } Y.$$

$k$  - коэффициент подобия, а фигуры  $F \sim F_1$  (подобны).

**Подобие не является движением, т.к. расстояния изменяются.**

## Свойства подобия.

1. Преобразование подобия переводит прямую в прямую, отрезок - в отрезок, луч - в луч.

Действительно, если точки  $A, B, C$  лежат на одной прямой, то  $AC=AB+BC$ , тогда  $A_1B_1 = k \cdot AB = k \cdot (AC - CB) = k \cdot AC - k \cdot CB = A_1C_1 - C_1B_1 \rightarrow A_1, C_1, B_1$  - лежат на прямой и порядок расположения точек сохраняется.

( $AC+CB$ )= $k \cdot AC+k \cdot CB=A_1C_1+C_1B_1 \rightarrow A_1, C_1, B_1$  - лежат на прямой и порядок расположения точек сохраняется.

2. Преобразование подобия сохраняет углы.

3. Преобразование подобия переводит треугольник в треугольник. Соответственные стороны этих треугольников пропорциональны, а соответственные углы равны.

4. Преобразование подобия переводит окружность в окружность.

5. Преобразование, обратное преобразованию подобия с коэффициентом  $k$ , есть преобразование подобия с коэффициентом, равным  $\frac{1}{k}$



6. Композиция преобразований подобия с коэффициентами  $k_1$  и  $k_2$  есть преобразование подобия с коэффициентом  $k=k_1 \cdot k_2$

# VII группа. Гомотетия.



## Определение.

Зададим точку  $O$  и число  $k \neq 0$ . Точки  $M$  и  $M_1$  являются соответствующими в гомотетии если  $\overrightarrow{OM_1} = k \cdot \overrightarrow{OM}$ .  
 $H_{O,k}(M) = M_1$ , где  $O$ - центр гомотетии,  $k$ - коэффициент гомотетии.





## Частные случаи гомотетии:

$k=1$  - тождественное преобразование

$k=-1$  - центральная симметрия относительно точки  $O$ .

## Теорема.

Гомотетия является подобием.



$$1. H_{O,k}(A) = A_1, H_{O,k}(B) = B_1 \rightarrow \overrightarrow{OA_1} = k \cdot \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB_1} = k \cdot \overrightarrow{OB}$$


$$2. A_1B_1 = OB_1 - OA_1 = k \cdot OB - k \cdot OA = k \cdot (OB - OA) = k \cdot AB$$

Следовательно, гомотетия является подобием

Из подобия следует, что расстояние между соответствующими точками не сохранилось, таким образом, **гомотетия не является движением.**

### Свойства гомотетии:

1. Гомотетия переводит прямую в прямую, отрезок- в отрезок;
2. Гомотетия с  $k>0$  переводит луч в себя (в сонаправленный луч), а гомотетия с  $k<0$  переводит луч в противоположно направленный луч;
3. Гомотетия сохраняет углы;



4. Гомотетия переводит окружность в окружность

$H_{o,k}(O_1)=O_2, H_{o,k}(X)=X_1 \rightarrow OO_2=k \cdot OO_1, OX_1=k \cdot OX_2, \angle O$ - общий  $\rightarrow \triangle OO_1X$  подобен  $\triangle OO_2X_1$  по второму признаку  $\rightarrow O_2X_1=k \cdot O_1X$ ;


т.к.  $X$  произвольная точка окружности, следовательно, окружность переходит в окружность;

5. Преобразование, обратное гомотетии с коэффициентом  $k \neq 0$ , есть гомотетия с тем же центром гомотетии и коэффициентом, равным  $\frac{1}{k}$

6. При  $k \neq 1$  гомотетия переводит прямую, не проходящую через центр гомотетии, в параллельную прямую, отрезок - в параллельный отрезок. Прямые, проходящие через центр гомотетии, отображаются на себя (Следует из подобия и из определения гомотетии);

7. Композиция двух гомотетий с общим центром и коэффициентами  $k_1$  и  $k_2$  есть гомотетия с тем же центром и коэффициентом  $k=k_1 \cdot k_2$ ;

8. Преобразование подобия с коэффициентом  $k$  есть композиция гомотетии с коэффициентом  $k$  и движения.




Пусть  $P_k(F)=F_1$ , где  $k>0 \rightarrow P_k(X)=X_1$  и  $P_k(Y)=Y_1 \rightarrow X_1Y_1=k \cdot XY$  (из определения подобия);  
 $H_{O,k}(F)=F^*$ ,  $k>0$  и  $O$ - произвольная  $\rightarrow H_{O,k}(X)=X^*$ ,  $H_{O,k}(Y)=Y^* \rightarrow X^*Y^*=k \cdot XY$  (из определения гомотетии);  
 Таким образом, для любых точек  $X^*; Y^*$  фигуры  $F^*$  верно равенство  $X_1Y_1=X^*Y^*$ ,  
 которое означает, что фигуры  $F^*$  и  $F_1$  равны, а значит, существует движение, переводящее фигуру  $F^*$  в фигуру  $F_1$ .





Пусть на плоскости задана окружность  $(O;r)$  с выколотым центром  $O$ . Инверсией  $I_{O,k}$  с полюсом  $O$  и степенью  $k=r^2$  называется взаимно - однозначное преобразование  $M \rightarrow M_1$  такое, что  $OM \cdot OM_1 = r^2$  (точки  $O, M, M_1$  - лежат на одной прямой).

A diagram showing a sphere with center  $O$ . A radius  $r$  is drawn from  $O$  to a point  $M$  on the sphere's surface. A horizontal line extends from  $O$  through  $M$  to a point  $M_1$  located outside the sphere.



1. Точка М внутри круга инверсии.  $MA \perp OM$ ;  $OA$ - радиус;  $AM_1 \perp OA$  ( $AM_1$  - касательная);  $M_1 = OM \cap AM_1$  ( $OM \cdot OM_1 = r^2$ , т.к. катет есть среднее геометрическое между гипотенузой и проекцией катета на гипотенузу);

2. Точка М - вне круга инверсии. Построения выполняются в обратном порядке: проводится касательная к окружности и из точки касания опускается перпендикуляр.

### Свойства инверсии:

1. Если при инверсии точка  $M$  переходит в  $M_1$ , то точку  $M_1$  эта инверсия переводит в точку  $M$  (инверсия - инволютивное преобразование, т.е.  $I^2 = e$  -тождественное преобразование)


$I_{o,k}(M) = M_1$ , то  $I_{o,k}(M_1) = M$ ;

2. При инверсии точки, расположенные внутри круга инверсии, переходят в точки, расположенные вне круга инверсии.

Точки, расположенные вне круга инверсии, переходят во внутренние точки круга.


Точки окружности инверсии переходят в себя.

3. Прямая, проходящая через центр инверсии, переходит в себя



Полуинтервал  $(OK] \rightarrow$  луч  $[Kb)$ , полуинтервал  $(OE] \rightarrow$  луч  $[Ea)$ ,  $K \rightarrow K$ ,  $E \rightarrow E$

4. Прямая, не проходящая через центр инверсии, переходит в окружность, проходящую через центр инверсии.



1. Если  $I_{o,k}(A)=A_1, I_{o,k}(B)=B_1$

$$\Rightarrow OA \cdot OA_1 = OB \cdot OB_1 = r^2$$

$$\Rightarrow OA:OB = OB_1:OA_1 \text{ и } \angle AOB = \angle B_1OA_1$$

$\Rightarrow \triangle AOB \sim \triangle B_1OA_1$  (II признак)

$$\Rightarrow \angle OBA = \angle OA_1B_1$$

2. Рассмотрим окружность инверсии

$(O, r)$  и прямую  $m$ , не проходящую через точку  $O$  и точку  $B \in m$ ,

проведем  $OA \perp m$ ,

построим точку  $A_1$  и  $B_1$

такие, что  $I_{o,k}(A)=A_1, I_{o,k}(B)=B_1$

По пункту (1)  $\triangle AOB \sim \triangle B_1OA_1$  и  $\angle OAB = \angle OB_1A_1 = 90^\circ \Rightarrow B_1$  лежит на окружности  $S$  с диаметром  $OA_1$ .