

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ: «ВІЛ. СНІД. ТИ ПОВИНЕН ЦЕ ЗНАТИ!»

**ПІДГОТУВАЛА:
СТУДЕНТКА ДРУГОГО КУРСУ, ГРУПИ
6024-СП,**

**ТРОЦЕНКО ЮЛІЯ
ОЛЕКСАНДРІВНА**





Не дай

СПИДУ



шанс!



**1 грудня —
Всесвітній
день боротьби
зі СНІДом**



Що таке СНІД?

С – синдром, тобто комплекс симптомів і захворювань.

Н – набутого, а не отриманого від батьків.

І – імунного, тобто такого, що стосується імунної системи.

Д – дефіциту, тобто нездатності імунної системи виконувати свої функції.

СНІД – кінцева стадія ВІЛ-інфекції.

СНІД починається, коли кількість лімфоцитів раптово зменшується і організм втрачає здатність протистояти різним інфекціям й утворенню в організмі ракових пухлин.



В - вірус

І - імунodefіциту

Л - людини

Цікаві відомості

- ✓ Вперше СНІД було зафіксовано у США в 1983 році. Тоді хворий помер упродовж двох місяців.
- ✓ Сьогодні за добу в світі чотириста тисяч осіб заражаються цією хворобою.
- ✓ Сам по собі СНІД не є смертельною хворобою, але його функціонування в організмі настільки ослаблює імунну систему, що навіть нежить може стати для хворого смертельним.

Вперше в науковій літературі
з'явилося повідомлення, що в
США виявлені хворі з
ураженням імунної системи,
котре супроводжується рядом
побічних захворювань

1981 рік.

Першовідкривачами вірусу стали **Люк Монтаньє**
(Франція) и **Роберт Галло** (США). В 1983 році (тільки
через два роки після виявлення перших випадків
хвороби) у лімфатичних вузлах хворого СНІДом був
виявлений вірус — збудник СНІДу





**Американськими вченими
отримано кінцеві докази
того, що першоджерелом
вірусу імунодефіциту
людини (ВІЛ), що викликає
СНІД, були шимпанзе, що
жили на волі. Завдяки
проведенню генетичного
аналізу калу приматів,
вчені змогли відслідкувати
окремих заражених
шимпанзе**

СИМПТОМИ:

У більшості людей після зараження ВІЛ не спостерігається жодних симптомів. Іноді за кілька днів після інфікування з'являються симптоми, що нагадують грип:

- збільшення лімфовузлів,
- лихоманка,
- втрата 10% ваги тіла впродовж двох місяців,
- слабкість.

Проте ці симптоми за кілька тижнів минають самі по собі. Безсимптомний етап розвитку хвороби може тривати до 10 років.



ВІЛ ПЕРЕДАЄТЬСЯ:

- 1.ПАРЕНТЕРАЛЬНО (ІН'ЄКЦІЙНО, ЧЕРЕЗ КРОВ ТА ІНШІ БІОЛОГІЧНІ РІДИНИ)**
- 2.СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ**
- 3. ВІД МАТЕРІ ДО ДИТИНИ**

НАРКОМАНІЯ

Від загальної кількості ВІЛ-інфікованих,
наркомани складають 88%

В Україні 450 тисяч молодих
людей з подвійним діагнозом
– ВІЛ - наркоманія...

52% заражень ВІЛ
відбувається «через
шприц»...



СТАТЕВІ СТОСУНКИ

За останні два роки число людей, які заразилися ВІЛ статевим шляхом, збільшилось майже *в два рази*.



На сьогоднішній день 45% заражень відбувається через незахищений секс.

МАТИ І ДИТИНА

За даними
Всесвітньої
організації
охорони
здоров'я,
ризик
передачі ВІЛ-
інфекції від
матері дитині
становить
20–45%.

При проведенні
відповідного лікування цей
ризик можна знизити до 1-
2%.



ВІЛ не передається:

- при рукостисканні чи обіймах
- при поцілунку/через слюну
- через піт або слюзи
- при кашлі або чханні
- при користуванні спільним посудом
- через постільну білизну
- при спільному користуванні ванною, туалетом, чи басейном
- через тварин і укуси комах





- **ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД користуються всіма правами та свободами, передбаченими Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами України**



(ст.17 Закону України “Про запобігання захворювання на СНІД та соціальний захист населення”)

Спосіб визначення інфекції


У відповідь на проникнення вірусу в організмі людини через один-три місяці утворюються антитіла. Їх поява є свідченням ВІЛ - інфекції, а виявляються антитіла з допомогою дослідження крові. Обстеження на СНІД проводяться в кабінетах довіри, де за бажанням це можна зробити анонімно.





Основна проблема
створення
лікарських
препаратів проти
СНІДу полягає у
високій
властивості ВІЛ
змінювати свою
структуру

На сьогодні не існує вакцини
для профілактики СНІДу і
недостатньо ефективні
методи лікарської терапії
цього захворювання



Сумна статистика



Україна за темпами розвитку епідемії ВІЛ-інфекції займає 1-е місце в Європі і 5-е — у світі.

Україна за темпами росту захворювання наздоганяє навіть Африку

При сьогоднішніх темпах розвитку захворювання в 2014 році від СНІДу в Україні щоденно буде помирати 140 людей.



Чи можна вилікувати СНІД?

Сучасні *антиретровірусні препарати* можуть пригнічувати розмноження вірусу і перешкоджати прогресуванню хвороби. Кардинальних змін в терапії *ВІЛ інфекції* досягнуто не було: *монотерапія* (лікування одним препаратом) виявилася недостатньо ефективною, хворі продовжували вмирати, незважаючи на.



ВИСНОВКИ:

- СНІД- небезпечне захворювання, яке викликається вірусом імунодефіциту
- СНІД поширюється через нашу необережність, а також не бажання змінити норми своєї поведінки
- Девіз “Твоє життя в твоїх руках” повинен стати нормою життя для кожної людини!

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ