

РАДИАЦИЯ

РАДИАЦИЯ-

- Это потоки фотонов, элементарных частиц или осколков деления атомов, способные ионизировать вещество.
- К ионизирующему излучению не относят видимый свет и ультрафиолетовое излучение, которые в отдельных случаях могут ионизировать вещество. Инфракрасное излучение, излучение сантиметрового и радиодиапазонов не является ионизирующим, поскольку их энергии недостаточно для ионизации атомов и молекул в основном состоянии.

Природа ионизирующего излучения

- Наиболее значимы следующие типы ионизирующего излучения:
- Коротковолновое электромагнитное излучение (поток фотонов высоких энергий):
 - рентгеновское излучение;
 - гамма-излучение.
- Потоки частиц:
 - бета-частиц (электронов и позитронов);
 - альфа-частиц (ядер атома гелия-4);
 - нейтронов;
 - протонов, других ионов, мюонов и др.;
 - осколков деления (тяжёлых ионов, возникающих при делении ядер).

Источники

- Природные источники ионизирующего излучения:

- Спонтанное

- Термоядерное

- Индуцированное в ядрах элементов

- Космическое


- Искуственное

- Искуственное

- Ядерное

- Ускорители заряженных частиц, генерирующие излучение

- Рентгеновский аппарат как разновидность ускорителя, генерирует тормозное рентгеновское излучение.



ИИЯ

Цепочка ядерных превращений

- В процессе ядерного распада или синтеза возникают новые нуклиды, которые также могут быть нестабильны. В результате возникает цепочка ядерных превращений. Каждое превращение имеет свою вероятность и свой набор ионизирующих излучений. В результате интенсивность и характер излучений радиоактивного источника может значительно меняться со временем.


Свойства ионизирующих излучений

- По механизму взаимодействия с веществом выделяют непосредственно потоки заряженных частиц и косвенно ионизирующее излучение (потоки нейтральных элементарных частиц — фотонов и нейтронов). По механизму образования — первичное (рождённое в источнике) и вторичное (образованное в результате взаимодействия излучения другого типа с веществом) ионизирующее излучение.

- Энергия частиц ионизирующего излучения лежит в диапазоне от нескольких сотен электрон-вольт (рентгеновское излучение, бета-излучение некоторых радионуклидов) до 10^{15} — 10^{20} и выше электрон-вольт (протоны космического излучения, для которых не обнаружено верхнего предела по энергии).
- Длина пробега и проникающая способность сильно различаются — от микрометров в конденсированной среде (альфа-излучение радионуклидов, осколки деления) до многих километров (высокоэнергетические мюоны космических лучей).

Химическое действие ионизирующего излучения

- Ионизирующее излучение может вызывать химические превращения, изучает излучение
- Превращает металлы
- Разлагает некоторые
- Превращает устойчивое серое, а
- Разлагает газы, соединения
- Полимеры, содержащие двойные и тройные связи.



ионизирующего

из-за чего

ионизирующим

ионизирующим

ионизирующим


ионизирующим

ионизирующим.

Знак радиационной опасности

- Международный условный знак радиационной опасности («трилистник», «вентилятор») имеет форму трёх секторов шириной 60° , расставленных на 120° друг относительно друга, с небольшим кругом в центре. Выполняется чёрным цветом на жёлтом фоне.
- В таблице символов Юникод есть символ знака радиационной опасности — .
- В 2007 году был принят новый знак радиационной опасности, в котором «трилистник» дополнен знаками «смертельно» («череп с костями») и «уйди!» (силуэт бегущего человека и указывающая стрелка). Новый знак призван стать более понятным для тех, кто не знаком со значением традиционного «трилистника».

СТАРЫЙ ОБРАЗЕЦ ЗНАКА



НОВЫЙ ОБРАЗЕЦ ЗНАКА

