

Тема 7. ИСКАЖЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Учебные вопросы:

1. **Ранний детский аутизм.**
2. **Классификация РДА.**
3. **Критерии диагностики РДА.**
4. **Особенности психического развития детей с РДА.**

Ранний детский аутизм (РДА) или синдром Каннера – это аномалия психического развития, состоящая главным образом в субъективной изолированности ребенка от внешнего мира и проявляющаяся в:

выраженной недостаточности или полном отсутствии потребности в контакте с окружающими, эмоциональной холодности или безразличии к близким ("аффективная блокада", по L. Kanner);

страхе новизны, любой перемены в окружающей обстановке;

болезненной приверженности к рутинному порядку;

расстройствах речи, характер которых существенно отличается при разных вариантах синдрома.

однообразном поведении со склонностью к стереотипным движениям;

ПРИЧИНЫ РДА

Влияние резидуально-органического фактора (последствия патологии беременности, родов, черепно-мозговых травм и инфекций).

Следствие недоразвития нейронных структур, необходимых для переработки информации.

Наследственно обусловленное недоразвитие ощущений.

Врожденная дисфункция мозга.

Некоторая врожденная эмоциональная хрупкость, плохая переносимость фрустраций, низкий порог возникновения тревоги.

- **Полная отрешённость от происходящего вокруг**, при попытках взаимодействия с ребёнком характерно проявление крайнего дискомфорта. Отсутствие социальной активности, даже близким трудно добиться от ребёнка какой-либо ответной реакции: улыбки, взгляда. Дети данной группы стараются не иметь никаких точек соприкосновения с окружающим миром, они могут игнорировать мокрые пелёнки и даже жизненно важные, витальные потребности — голод. Очень тяжело переносят взгляд глаза в глаза и избегают различных телесных контактов.

Классификация РДА по степени тяжести

- **Захваченность аутистическими интересами.**

Дети этой группы стараются укрыться от окружающего мира в своих интересах, при этом их занятия проявляются в стереотипичной форме и не носят познавательного характера. Увлечения носят циклический характер, ребёнок может годами разговаривать на одну и ту же тему, рисовать или воспроизводить один и тот же сюжет в играх. Интересы зачастую носят мрачный, устрашающий, агрессивный характер.

Классификация РДА по степени тяжести

● **Активное отвержение окружающей среды.**

Характеризуется не как отрешённость, а как тщательная избирательность в контактах с внешним миром. Ребёнок общается с ограниченным кругом людей, зачастую это родители, близкие люди. Проявляет повышенную избирательность в еде, одежде. Любое нарушение привычного ритма жизни ведёт к сильной аффективной реакции. Детям данной группы более, чем другим, свойственно испытывать чувство страха, на который они реагируют агрессивно, бывает, что агрессия принимает формы аутоагрессии. Наблюдается большое количество речевых и двигательных стереотипий. Несмотря на всю тяжесть различных проявлений дети гораздо более адаптированы для жизни, чем дети относящиеся к 1-ой группе.

Классификация РДА по степени тяжести

- **Чрезвычайная трудность во взаимодействии с окружающей средой.**

Наиболее легкий вариант проявления аутизма.

Основными чертами является: повышенная ранимость; уязвимость таких детей; избегание отношений, если ребёнок чувствует какую-либо преграду; чувствительность к чужой оценке.

Классификация РДА по степени тяжести

Отличие аутизма от других расстройств

Умственная отсталость.

Снижение интеллекта у умственно отсталых детей носит равномерный, тотальный и качественно иной характер. Дети в большей степени используют значения слов, особенно при синдроме Дауна, способны и стремятся к установлению эмоциональных отношений с окружающими.

Дезинтегративные расстройства

Синдром Ретта.

В этом случае имеется период кажущегося нормального развития до 6-20 месяцев, затем следует потеря целенаправленных движений руками, быстро нарастает интеллектуальный дефект, появляются неврологические симптомы.

Шизофрения.

Дети с аутизмом, как правило, не проявляют расстройств мышления с бредом и галлюцинациями. Детская шизофрения обычно начинается после периода относительно нормального развития. Также имеется наследственная отягощенность шизофренией.

Отличие аутизма от других расстройств

Синдром Геллера.

Начало этого расстройства относится к 3-4 годам, когда у ребенка, до этого нормально развивавшегося, появляются отчетливые поведенческие нарушения в виде непослушания, раздражительности, быстро теряется речь, двигательные навыки, нарастает интеллектуальное снижение.

Депривационные расстройства.

В данном случае аутистические проявления возникают в результате психосоциальной депривации, например, при помещении ребенка в Дом ребенка. Изменение ситуации, обеспечение соответствующей стимуляции (до определенного возраста) приводит к улучшению коммуникативного поведения.

Время появления
первых симптомов в
возрасте не позднее
30 месяцев.

Дефицитарность
речевого развития.

Основополагающая
недостаточность
реакций на
окружение.

Критерии диагностики РДА

Причудливость
реакций на
окружение:
сопротивление
изменениям,
своеобразное,
заинтересованное
отношение к
отдельным,
одушевленным или
неодушевленным
объектам.

Отсутствие бреда и
галлюцинаций.
Ассоциативная
слабость и
бессвязность, как
при шизофрении.

В случае наличия
речи - ее
своеобразие,
например,
отставленные
эхолалии,
метафорический
язык, искаженное
использование
личных
местоимений.

**Особенности
психического
развития
детей при
аутизме**

- Стереотипность, обусловленная ограниченной способностью гибкого взаимодействия со средой, возможностью приспособиться только к устойчивым формам жизни.
- Задержка формирования навыков самообслуживания, освоения обычных, необходимых в жизни действий с предметами.
- Нарушение ориентировки в пространстве и времени, искажения целостной картины реального мира и вычленение отдельных, значимых для ребенка ощущений, звуков, красок, форм.
- Темпы развития речи неравномерны и асинхронны, речь не используется (или недостаточно используется) в коммуникативных целях.