

Входящие и выходящие тесты по теме: Контрацепция и аборты

1. КОК можно применять для профилактики рака:

- [А] влагалища**
- [Б] маточной трубы**
- [В] яичников**
- [Г] молочной железы**
- [Д] шейки матки**

2. Какой метод прерывания беременности наименее опасный:

- [А] инструментальный аборт**
- [Б] медикаментозный аборт**
- [В] мини аборт – вакуумная аспирация**
- [Г] амниоцентез**

3. Осложнения беременности при использовании ВМС включают все перечисленное, кроме:

- [А] врожденных аномалий развития плода**
- [Б] эктопической беременности**
- [В] ВЗМОТ**
- [Г] невынашивания беременности**

4. Больная принята с подозрением на внематочную беременность. Но при осмотре обнаружено: наружный зев приоткрыт, матка увеличена до 8 недель беременности, болезненная, мягкая, придатки не определяются, выделения из половых путей обильные ярко кровянистые. Своды влагалища свободные. Вероятный диагноз:

- а) самопроизвольный аборт**
- б) апоплексия яичника**
- в) прервавшаяся эктопическая беременность**
- г) метроэндометрит**

5. Риск перфорации матки при инструментальном аборте возрастает:

- а) при множественных абортах в анамнезе**
- б) при трофобластической болезни**
- в) при перенесенных воспалительных заболеваниях**
- г) при двурогой матке**
- д) при всем перечисленном**

6. Основное(ые) требования к контрацептивам:

- а) высокая эффективность**
- б) безопасность**
- в) обратимость**
- г) хорошая переносимость**
- д) все перечисленное**

7. Методы естественного планирования семьи все перечисленное, кроме

- а) метод лактационной аменореи**
- б) прерванный половой акт**
- в) ритмический метод**
- г) барьерный метод**
- д) абстиненции**

8. К гормональным контрацептивам рилизинг-системам относят:

- а) ВМК – Мирена**
- б) подкожные импланты: «Норплант» и «Импланон»**
- в) влагалищное кольцо «Нова Ринг»**
- г) накожный пластырь «Евра»**
- д) все перечисленное**

9. Контрацептивы прогестеронового ряда все перечисленные, кроме

- а) лактинет**
- б) депо-провера**
- в) циклофем**
- г) эскапел**

10. В настоящее время среди КОК не находят применения:

- а) однофазные**
- б) трёхфазные**
- в) двухфазные**

11. Прогестин производный прогестерона в составе КОК:

- А) левоноргестрел**
- б) хлормадион**
- в) диеногест**
- г) дезогестрел**
- д) дросперион**

12. Прогестин в составе КОК имеющий высокую андрогенную активность

- а) дезогестрел**
- б) гестодент**
- в) леваноргестрел**
- д) диеногест**

13. Прогестин в составе КОК имеющий самую высокую антиандрогенную активность:

- а) гестодент**
- б) диеногест**
- в) ципротерон**
- г) дросперинон**
- д) левоноргестрел**

14. Прогестины в составе КОК имеющие низкую андрогенную активность, кроме

- а) норгестимат**
- б) дезогестрел**
- в) гестодент**
- г) левоноргестрел**

15. Прогестины в составе КОК производные прогестерона, кроме:

- а) номегэстрол**
- б) дезогестрел**
- в) хлормадион**
- г) ципротерон**

16. Прогестин в составе КОК производный спиронолактона:

- а) диеноргест**
- б) хлормадион**
- в) левоноргестрел**
- г) гестагент**
- д) дросперион**

17. Механизм действия КОК все перечисленное, кроме

- а) снижение синтеза ЛГ и ФСГ, что приводит к торможению овуляции**
- б) восстановление биоценоза влагалища**
- в) железистая регрессия эндометрия**
- г) изменение структуры цервикальной слизи**
- д) торможение сократительной способности труб**

18. Прогестин, входящий в КОК «Жанин»:

- а) дросперинон**
- б) диеногест**
- в) гестагент**
- г) левоноргестрел**
- д) дезогестрел**

19. Прогестин, входящий в состав КОК «Регулон»:

- а) дросперинон**
- б) диеногест**
- в) гестагент**
- г) левоноргестрел**
- д) дезогестрел**

20. Прогестин, входящий в состав КОК «Клайра»:

- а) дезогестрел**
- б) диеногест**
- в) левоноргестрел**
- г) дросперинон**
- д) гестодент**

Ответы по теме: «Контрацепция и аборты»

1. В.

2. Б.

3. А.

4. А.

5. Д.

6. Д.

7. Г.

8. Д.

9. В.

10. В.

11. Б.

12. В.

13. В

14. Б.

15. Б

16. Д

17. Б

18. Б

19. Д

20. Б