


**ВОЛК**

**ВИДЫ**





- подвид вида волк обыкновенный (*Canis lupus*), один из нескольких подвидов, обитающих в России. Ареал тундрового волка занимает зону тундры и лесотундры европейской части и Сибири вплоть до арктического побережья, а также Камчатки. Вопреки распространённому мнению, тундровый волк не является самым крупным из подвидов волка, уступая по этому критерию полярному волку. Размещение волков по тундре определяет размещение оленей.

## ТУНДРОВЫЙ ВОЛК

---

# CANIS LUPUS ALCES

- ▣ вымерший подвид волка (*Canis lupus*), некогда обитавший на территории полуострова Кенай, расположенного на южной Аляске. Найденные останки позволяют сделать вывод, что животное было около 210 см длиной, не считая хвоста, которой достигал в длину 60 см. Большой рост (110 см) и вес (более 90 кг) помогали этому подвиду волка в охоте на лосей, населяющих полуостров. Считается, что это был крупнейший представитель псовых. *C.l.alces* был впервые описан в 1944 году американским зоологом Эдвардом Голдманом как один из четырёх подвидов Аляски[3].
- ▣ *C.l.alces* регулярно наблюдали с начала 1890-х, когда в эти места прибыли поселенцы, движимые Золотой лихорадкой. В результате охоты и применения стрихнина к концу 1910-х популяция волка была практически полностью уничтожена.
- ▣ Разрозненные сообщения о наблюдении волков на протяжении 1940-х не подтверждались до 1960-х. Однако неизвестно, были ли это новые группы волков, представляющие другие аляскинские подвиды, или это, возможно, потомки немногих выживших *C.l.alces*. Генетические исследования показали, что *C.l.alces*, как минимум, был связан с другими подвидами волков Аляски.



- подвид вида волк обыкновенный (*Canis lupus*), который ранее встречался по всей территории Аравийского полуострова, однако теперь живёт на ограниченных ареалах в южном Израиле, Омане, Йемене, Иордании, Саудовской Аравии и, возможно, в некоторых частях Синайского полуострова в Египте.

**АРАВИЙСКИЙ ВОЛК**

---



- также иногда именуется элсмирский или арктический — подвид волка, встречающийся на группе арктических островов в Северной Америке и в северной части Гренландии. В честь одного из них, Мелвилла, подвид получил своё название (аналогично, элсмирский в честь острова Элсмир). Особь данного подвида выделяется светлым белым или серым мехом.

## МЕЛВИЛЬСКИЙ ОСТРОВНОЙ ВОЛК



## МЕКСИКАНСКИЙ ВОЛК

- один из малых подвигов североамериканского серого волка. Масса тела взрослой особи — от 23 до 41 килограммов, длина тела — от 1,4 до 1,7 метра, рост — от 66 до 81 сантиметров.
- Окрас у мексиканского волка серый или темно-серый. Из всех волков мексиканский волк обладает самой длинной гривой.



- вымерший подви́д серого волка. Ареал охватывал остров Ньюфаундленд и восточный берег Канады. По описаниям, это был крупный белый волк с черной полосой вдоль позвоночного хребта.
- В настоящее время экологическая ниша ньюфаундлендского волка занята койотами.

## **НЬЮФАУНДЛЕНДСКИЙ ВОЛК**

---

# ПУСТЫННЫЙ ВОЛК

---

- небольшой волк, обитающий в степи и пустынях Средней Азии. Имеет короткую жёсткую шерсть бледно-серого цвета с вкраплениями цвета охры. В целом несколько мельче лесного, с более редким и грубым волосом. В его ареал входят степи Казахстана и юга России, в том числе Предкавказские, Прикаспийские, Приуральские и Нижнего Поволжья. Изучен слабо. Не разработана система определённых признаков. Численность невысока, особенно в западных частях ареала.



- один из подвигов серого волка (*Canis lupus*). Эндемик острова Ванкувер. Окрас серый или чёрный. Эти животные ведут социальный образ жизни, проживают в стаях, насчитывающих от 5 до 35 особей. Основу питания составляют чернохвостые олени (*Odocoileus columbianus*) и олени Рузвельта (*Cervus elaphus roosevelti*).
- Ванкуверские волки по своему характеру очень пугливые, редко встречаются с людьми. Находятся под угрозой вымирания. В национальном парке Пасифик-Рим они нападают на незащищённых домашних собак. В Ванкуверском зоопарке содержатся два ванкуверских островных волка, один из них белого, а другой серого цвета.

## **ВАНКУВЕРСКИЙ ОСТРОВНОЙ ВОЛК**

---



- вторично одичавшая домашняя собака, единственный плацентарный хищник в фауне Австралии до прихода европейцев. Название «динго» возникло в начале европейской колонизации Нового Южного Уэльса и, по всей вероятности, происходит от «тинго» — термина, использовавшегося аборигенами Порт-Джексона для описания своих собак.

**ДИНГО**



- домашнее животное, одно из наиболее распространённых (наряду с кошкой) «ЖИВОТНЫХ-КОМПАНЬОНОВ».

**СОБАКА**

---



- подвид волка, одичавшая собака. Обитает в лесах Новой Гвинеи. Классификация спорная, иногда считается отдельным видом, *Canis hallstromi*, иногда считается тем же подвидом, что и динго.

**НОВОГВИНЕЙСКАЯ ПОЮЩАЯ СОБАКА**

- название двух подвигов вида волка обыкновенного (*Canis lupus*), обитавших на островах Японии. В принятой классификации этот термин относится к волку Хоккайдо (*Canis lupus hattai*), (蝦夷狼, Ezo-ōkami), также известному как волк Эдзо, обитавшему на острове Хоккайдо. Второй подвид — Волк хондосский японский или волк Хонсю (*Canis lupus hodophilax*).



## ЯПОНСКИЙ ВОЛК



- светлоокрашенный волк средней величины, на зиму линяющий в белый цвет. Его иногда называют тундровым волком. Гудзонский волк обитает к западу и северу от Гудзонова залива. Волк ведёт кочевой образ жизни, мигрируя на юг вместе со стадами оленей карибу.

**ГУДЗОНСКИЙ ВОЛК**

---



- подвид волка серого (*Canis lupus*). Первоначально распространился по большей части Евразии с ограничением на юге Гималаями, Гиндукушем, Копетдагом, Кавказом, Чёрным морем и Альпами, и ограничением на севере между  $60^{\circ}$  и  $70^{\circ}$  северной широты, это заставило отступить популяцию волка назад из большей части Западной Европы и восточного Китая, которая продолжила существовать преимущественно в Центральной Азии. В настоящее время обыкновенный волк имеет наибольшее распространение среди всех подвидов волка и обитает в основном в Европе и Азии, простираясь через Западную Европу, Скандинавию, Россию, Китай, Монголию, Азербайджан и Гималайские горы.

## ЕВРАЗИЙСКИЙ ВОЛК

---



- хищное животное рода волков, обитающее на юго-востоке провинции Онтарио и юго-западе провинции Квебек (Канада). Классификация восточного волка неоднозначна: хотя чаще всего его считают подвидом серого волка (лат. *Canis lupus lycaon*), есть также мнения, выделяющие его в отдельный вид *Canis lycaon* или рассматривающие как гибрид серого и рыжего волка или серого волка и койота.

## ВОСТОЧНЫЙ ВОЛК

---

# ВОЛК ВЕЛИКИХ РАВНИН

---

- Когда-то ареал этого подвида охватывал поперёк запад США и юг Канады. Однако к 30-м годам XX века этот подвид был почти полностью уничтожен. В 1974 году он был внесён в список вымирающих животных, и с тех пор численность волка Великих Равнин увеличивалась. В 2004 году популяция насчитывала 3700 особей, живущих в штатах Миннесота, Мичиган и Висконсин. Об отдельных волках сообщили в Дакоте и даже на юге в Небраске, но как предполагают, это особи, отбившиеся от своих стай.
- Этот подвид стал сторониться людей, вторгающихся на их территорию.



- также известный как Волк Скалистых гор, Аляскинский волк или Канадский волк — вероятно, самый большой подвид волка в Северной Америке. Его ареал включает западные части США, большую часть Западной Канады, Аляску, остров Унимак Алеутского архипелага, Йеллоустон и центральный Айдахо.

**МАКЕНЗИЙСКИЙ РАВНИННЫЙ ВОЛК**



- подвид серого волка, который обитает на территории Ливана, Турции, Ирана, Афганистана, Пакистана, Сирии, Индии и других близлежащих регионов.

**АЗИАТСКИЙ ВОЛК**

---



- хищное млекопитающее, подви́д обыкновенного волка. Ранее считался отдельным видом *Canis rufus*. Не стоит путать с красным волком (*Canis alpinus*).

**РЫЖИЙ ВОЛК**

---



- среди местных жителей известный как Lobo, — подви́д обыкновенного волка, который населяет леса и равнины северной Португалии и северо-западной Испании.

**ИБЕРИЙСКИЙ ВОЛК**

---

# ПОЛЯРНЫЙ ВОЛК

---

- подвид волка. Обитает на всей территории Арктики и в тундре, за исключением льдин и больших территорий, покрытых льдом.